



## Oplysningskema

**B**

Bedes udfyldt og afleveret til personalet

---

### **MRSA.**

MRSA er stafylokok-bakterier, som er smitsomme og meget modstandsdygtige (resistente) over for de almindelige brugte antibiotika (penicilliner) mod infektion.

Bakterien smitter overvejende gennem kontakt med en person, der har MRSA.

Har man MRSA, findes bakterierne ofte i næse, svælg, på hud og i eventuelle sår. MRSA påvises ved podning.

Du er i risiko for at have MRSA, hvis du kan svare ja på et eller flere af de næste tre spørgsmål:

- |  |                                |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Har du – eller har du tidligere haft – MRSA?.....  | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| Har du inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med en MRSA-positiv person? .....                                | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |
| Har du indenfor de sidste 6 måneder været undersøgt eller behandlet på hospital/klinik uden for Skandinavien?..... | Ja<br><input type="checkbox"/> | Nej<br><input type="checkbox"/> |


Dato: \_\_\_\_\_

Dit navn \_\_\_\_\_

Dit CPR nummer \_\_\_\_\_ Dit telefonnummer: \_\_\_\_\_

Tak for hjælpen  
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Denne del af skemaet anvendes af medarbejderne i afdelingen.



\* Se dog "OBS" herunder

**Podning : (lyserød e-swab)**

- 1) Begge næsebor ( samme podepind) - 2) Svælg - 3) Perineum - 4) Hudforandringer/sår

**Isolation** : se VIP " Isolationsregimer ved Methicillin resistente staphylococcus aureus ( MRSA)

**Invasive indgreb** er drop, dræn, kateter, syning af sår ( ikke injektioner eller blodprøver ).

**OBS** – patienter der opholder sig i asylcenter/flygtningelejr skal podes ved hver ambulant kontakt. Ved indlæggelse skal de podes OG isoleres. Podning skal laves her i huset og ikke ved praktiserende læge.