



Vejledning gravide ift. generel håndtering og evt. behandling med monoklonale antistoffer: Symptomer på COVID eller testet pos. for COVID\*  
**MÆRKER NORMALT LIV**



- \* Der skal foretages en PCR-test, hvis kun positiv kvik-test (pos. < 14 dage).
- \*\* **Lette symp.:** feber, hoste, træthed, nedsat smags- eller lugtesans, hovedpine, generel ømhed.
- \*\*\* **Svære symp.:** vejrtræknings-, tale- el. bevægelsesbesvær, åndenød, bryst smerter, forvirring.
- # **Vaccinedækket:** vaccineret x 2 + 14 dage el. vaccineret x 3 + 14 dage. Max. vaccinealder: 6 mdr. SARS-CoV-2 infektion < 12 uger = immun eller ≥ 12 uger + vaccination

Vejledning gravide ifht. generel håndtering og evt. behandling med monoklonale antistoffer: symptomer på COVID eller testet pos. COVID\*  
**MÆRKER MINDRE LIV**



- \* Der skal foretages en PCR-test, hvis kun positiv kvik-test (positiv < 14 dage).
- \*\* **Lette symp.:** feber, hoste, træthed, nedsat smags- eller lugtesans, hovedpine, generel ømhed.
- \*\*\* **Svære symp.:** vejrtræknings-, tale- el. bevægelsesbesvær, åndenød, brystsmærter, forvirring.
- # **Vaccinedækket:** vaccineret x 2 + 14 dage el. vaccineret x 3 + 14 dage. Max vaccinealder: 6 mdr. SARS-CoV-2 infektion < 12 uger = immun eller > 12 uger + vaccination