

Registrering af aborter

Generelt

Vælg forløbselement AHH 16, med forløbslabel "Graviditet, fødsel og barsel".

I ambulant kontakt forud for kir. abort, vælg aktionsdiagnosen DZ322 "Undersøgelse forud for provokeret abort".

Når mifegyne og/eller cytotec udleveres, kodes dette i "Ydelseskodning" (se ydelser nedenfor).

Fremsøg relevant aktionsdiagnose i diagnoselisten (se diagnoser nedenfor).

Ved provokeret abort anvendes GA (fastsat ved UL) svarende til den dag aborten opstartes medicinsk, eller udføres kirurgisk. Ved missed abortion eller spontane aborter kodes GA (ud fra SM) svarende til den dag, hvor man konstaterer at fosteret er gået til.

Den dag aborten opstartes medicinsk, eller udføres kirurgisk udfyldes "**Obstetrisk historik**". Klik "**Tilføj tidligere graviditeter**" og anfør følgende: **dato for abort, GA samt aborttype**. Husk derefter at klikke på "**Marker som gennemgået**".

Eventuelle komplikationer (DO08*-koder) registreres som bidiagnoser.

Ved ny patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose DO08* som aktionsdiagnose.

Hvis pt efterfølgende kommer til ambulant kontrol, eller der er telefonisk kontakt med pt (feks til HCG-svar) "løses" abortdiagnosen i diagnoselisten, og der kodes med DZ098C "Kontrolundersøgelse efter abort IKA".

Diagnose		Kriterier og anvendelse
Provokeret abort før 12 uger		
Diagnose		
DO049	Fremkaldt abort før 12 graviditetsuger, komplet eller ikke specificeret uden komplikation	
Ydelser		
BKHD401A	Medicinsk induceret tidlig abort med mifepriston 200 mg	Mifegyne
BKHD411G	Medicinsk induceret tidlig abort med misoprostol 0,8 mg	Cytotec
KLCH00	Provokeret abort ved udskrabning	
KLCH03	Provokeret abort ved vakuumaspiration	
ZZ4230	Graviditetsbestemmelse, Se-HCG	
UXUD82	Transvaginal UL-undersøgelse af genitalia feminina	
Missed abortion		
Diagnoser		
DO020	Graviditet uden erkendt foster (blighted ovum)	
DO021	Graviditet med dødt retineret foster	Ved minimal blødning (ellers DO03*)
Ydelse		
BKHD52	Behandling med antiprogesteron og prostaglandin	
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	
Ekstrauterin graviditet		
Diagnose		
DO009	Ektopisk graviditet UNS.	For specificerede koder DO00*-DO008* se SKS-browseren
Ydelser		
KLBC24	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingektomi	Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBC23	Fjernelse af tubagraviditet med salpingektomi	Åbent indgreb. Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBC21	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi	Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
BKHE8A	Behandling med methotrexat ved ekstrauterin graviditet (mola)	
Mola		
Diagnoser		
DZ0380	Observation pga. mistanke om sygdom i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel.	Der registreres med tillægskode DO019 Mola UNS indtil mik svar.
DO010	Mola hydatidosa complete	Husk cancerregistrering.
DO011	Mola hydatidosa incompleta	Husk cancerregistrering.

Spontan abort

Bemærk: Ved sene spontane aborter efter 16 uger skal også tilføjes som tillægskode hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret.

Diagnoser

DO030	Inkomplet spontan abort kompliceret med underlivsinfektion	
DO031	Inkomplet spontan abort kompliceret med sen eller excessiv blødning	Ved medicinsk eller kirurgisk behandling.
DO039	Komplet eller ikke specificeret spontan abort uden komplikation	Denne kode anvendes hvis ingen medicinsk el kirurgisk behandling.

Ydelse

BKHD50	Behandling med prostaglandin	Cytotec.
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	

PUL (Pregnancy with unknown location)

Diagnoser

DZ321L	Bekræftet graviditet med ukendt lokalisation	Indtil evt PUL.
DO022	Afsluttet graviditet med ukendt lokalisation	

Provokerede sene aborter

Ved ab pro fra 12+0 skal tilføjes baggrund for samrådsabort, og hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret. Dette registreres tillægskode til abort-aktionsdiagnosen.

Hvis misdannelser eller mistanke om misdannelser er relevant DQ* - diagnose obligatorisk.

Hvis der er en stork i headeren (fordi pt har et graviditetsforløb), gå til "**Obstetrisk historik**" og klik på den linje som er indeværende graviditet. Klik "**Tilføj nyfødt baby**", og **anfør dato for abort og udfald (aborttype)**. Husk derefter at klikke på "**Marker som gennemgået**".

Hvis der *ikke* er en stork i headeren, gå i "Obstetrisk historik" som anført i boksen på første side.

OBS. Ved abort hvor fosteret kvitteres > GA 21+6, eller hvor fosteret viser livstegn (uanset GA), kræves fuld fødselsindberetning. Der registreres med DO836 eller DO846 som aktionsdiagnose, samt abortkode DO050 eller DO059 som bidiagnose.

Diagnoser

DO050	Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger uden samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred	
DO059	Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger med samrådstilladelse	

Ydelser

BKHD44	Medicinsk induceret sen abort med antiprogesteron	Mifegyne.
BKHD45	Medicinsk induceret sen abort med prostaglandin	Cytotec.
KLCH13	Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort	Ved retineret væv/placenta

Andre ydelser

(relevant ved alle typer abort)

KLWW00	Re-evakuering af livmoder efter provokeret abort	Efter tidl evac eller kirurgisk abort.
KMWW00	Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort	Efter tidl evac eller spontan abort.
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	Efter medicinsk abort.
KMBA03	Udskrabning efter fødsel eller abort	Med curette.
KLCH13	Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort	Ved retineret væv/placenta
NAAD0B	Epidural blokade til smertelindring	
NAAC	Generel anæstesi	
BPMD01C	Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet	
BJCZ00	Indlæggelse af spiral med kobber	
BJCZ01	Indlæggelse af spiral med hormon	

Øvrige diagnoser

DO081G	Blødning efter abort	Som indikation for evac eller medicinsk behandling.
DO088J	Fortsat graviditet efter forsøg på medicinsk abort	Ved fortsat levende graviditet.
DO088K	Fortsat graviditet efter forsøg på kirurgisk abort	Ved fortsat levende graviditet.
DO088L	Retineret væv efter abort	
DO209	Blødning tidligt i graviditeten UNS	Ved GA < 22+0
DZ321C	Bekræftet graviditet ved ultralyd	

Ambulant efterforløb (uanset abort-type)

Diagnose

DZ098C	Kontrolundersøgelse efter abort IKA	
--------	-------------------------------------	--