

# Registrering af aborter

## Generelt

Vælg forløbselement AHH 16, med forløbslabel "Graviditet, fødsel og barsel".

Vælg aktionsdiagnosen DZ322 "Undersøgelse forud for provokeret abort" i ambulans kontakt forud for kir. abort.

Når mifegyne og/eller cytotec udleveres, kodes dette i "Ydelseskodning" (se ydelser nedenfor).

Vælg relevant aktionsdiagnose i diagnoselisten (se diagnoser nedenfor).

**Opdater "Obstetrisk historik"**. Brug evt navigatoren "Tidlig graviditet".

Ved provokeret abort anvendes GA (fastsat ved UL) svarende til den dag aborten opstartes (ved medicinsk abort) eller udføres (kirurgisk).

Ved missed abortion eller spontane aborter kodes GA (ud fra SM) svarende til den dag, hvor man konstaterede, at fosteret var gået til.

Eventuelle komplikationer (DO08\*-koder) registreres som bidiagnoser.

Ved ny patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose DO08\* som aktionsdiagnose.

Hvis pt kommer til ambulans efter-kontrol "løses" abort-diagnosen i diagnoselisten, og der kodes med DZ098C "Kontrolundersøgelse efter abort IKA".

Diagnose		Kriterier og anvendelse
<b>Provokeret abort før 12 uger</b>		
<b>Diagnose</b>		
DO049	Fremkaldt abort før 12 graviditetsuger, komplet eller ikke specificeret uden komplikation	
<b>Ydelser</b>		
BKHD401A	Medicinsk induceret tidlig abort med mifepriston 200 mg	Mifegyne
BKHD411G	Medicinsk induceret tidlig abort med misoprostol 0,8 mg	Cytotec
KLCH00	Provokeret abort ved udskrabning	
KLCH03	Provokeret abort ved vakuumaspiration	
ZZ4230	Graviditetsbestemmelse, Se-HCG	
UXUD82	Transvaginal UL-undersøgelse af genitalia feminina	
<b>Missed abortion</b>		
<b>Diagnoser</b>		
DO020	Graviditet uden erkendt foster (blighted ovum)	
DO021	Graviditet med dødt retineret foster	
<b>Ydelse</b>		
BKHD52	Behandling med antiprogesteron og prostaglandin	
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	
<b>Ekstrauterin graviditet</b>		
<b>Diagnose</b>		
DO009	Ektopisk graviditet UNS.	For specificerede koder DO00*-DO008* se SKS-browseren
<b>Ydelser</b>		
KLBC24	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingektomi	Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBC23	Fjernelse af tubagraviditet med salpingektomi	Åbent indgreb. Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBC21	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi	Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
BKHE8A	Behandling med methotrexat ved ekstrauterin graviditet (mola)	
<b>Mola</b>		
<b>Diagnoser</b>		
DZ038O	Observation pga. mistanke om sygdom i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel.	Der registreres med tillægskode DO019 Mola UNS indtil mik svar.
DO010	Mola hydatidosa complete	Husk cancerregistrering.
DO011	Mola hydatidosa incompleta	Husk cancerregistrering.

## Spontan abort

Bemærk: Ved sene spontane aborter efter 16 uger skal også tilføjes som tillægskode hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret.

### Diagnoser

DO030	Inkomplet spontan abort kompliceret med underlivsinfektion	
DO031	Inkomplet spontan abort kompliceret med sen eller excessiv blødning	
DO039	Komplet eller ikke specificeret <b>spontan abort uden komplikation</b>	
<b>Ydelse</b>		
BKHD50	Behandling med prostaglandin	Cytotec.
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	

## PUL (Pregnancy with unknown location)

### Diagnoser

DZ321L	Bekræftet graviditet med ukendt lokalisation	Indtil evt PUL.
DO022	Afsluttet graviditet med ukendt lokalisation	

## Provokerede sene aborter

Ved ab pro fra 12+0 skal tilføjes baggrund for samrådsabort, og hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret. Dette registreres tillægskode til abort-aktionsdiagnosen.

Hvis misdannelser eller mistanke om misdannelser er relevant DQ\* - diagnose obligatorisk.

OBS. Ved abort hvor fosteret kvitteres > GA 21+6, eller hvor fosteret viser livstegn (uanset GA), kræves fuld fødselsindberetning. Der registreres med DO836 eller DO846 som aktionsdiagnose, samt abortkode DO050 eller DO059 som bidiagnose.

### Diagnoser

DO050	Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger <b>uden</b> samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred	
DO059	Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger <b>med</b> samrådstilladelse	

### Ydelser

BKHD44	Medicinsk induceret sen abort med antiprogesteron	Mifegyne.
BKHD45	Medicinsk induceret sen abort med prostaglandin	Cytotec.
KLCH13	Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort	Ved retineret væv/placenta

## Andre ydelser

(relevant ved alle typer abort)

KLWW00	Re-evakuering af livmoder efter provokeret abort	Efter tidl evac eller <b>kirurgisk</b> abort.
KMWW00	Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort	Efter tidl evac eller <b>spontan</b> abort.
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	Efter <b>medicinsk</b> abort.
KMBA03	Udskrabning efter fødsel eller abort	Med curette.
KLCH13	Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort	Ved retineret væv/placenta
NAAD0B	Epidural blokade til smertelindring	
NAAC	Generel anæstesi	
BPMD01C	Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet	
BJCZ00	Indlæggelse af spiral med kobber	
BJCZ01	Indlæggelse af spiral med hormon	

## Øvrige diagnoser

DO081G	Blødning efter abort	Som indikation for evac eller medicinsk behandling.
DO088J	Fortsat graviditet efter forsøg på medicinsk abort	Ved fortsat levende graviditet.
DO088K	Fortsat graviditet efter forsøg på kirurgisk abort	Ved fortsat levende graviditet.
DO088L	Retineret væv efter abort	
DO209	Blødning tidligt i graviditeten UNS	Ved GA < 22+0
DZ321C	Bekræftet graviditet ved ultralyd	

## Ambulant efterforløb (uanset abort-type)

### Diagnose

DZ098C	Kontrolundersøgelse efter abort IKA	
--------	-------------------------------------	--

Ved spørgsmål kontaktes Mads Breining (3862 1834), Mette Mandrup (3862 0418) Stine Anthony (2036 2841) eller Lene Eskildsen (2036 2825).