

## Appendix 1 – Fødeplaner iht. Virusload.

### **FØDEPLAN v/ HIV-RNA < 50 kopier/ml**

- Der stiles mod vaginal forløsning
- HSP bør undgås
- Ved vandafgang uden veer stimuleres med s-drop og ved vandafgang > 18(24)t uden udsigt til snarlig fødsel overvejes forløsning ved sectio
- Der skal gives antibiotisk behandling ved vandafgang > 18 t. iht retningslinier
- Der er kontraindikation for scalp-elektrode, scalp-pH samt relativ kontraindikation for vacuum ekstraktion og tang.
- V/episiotomi gives profylaktisk antibiotika i.v. Zinacef 1,5 g. Infiltrationsanæstesi, pudendusblokada kan anvendes.
- Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum.
- Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur behandling af barn, samt HIV-screening.
- Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulans kontrol i infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet.

### **FØDEPLAN v/ HIV-RNA 50-399 kopier/ml - Vaginal**

- Der er planlagt at stile mod vaginal fødsel
- HSP bør undgås
- Ved vandafgang uden veer stimuleres med s-drop og ved vandafgang > 4-6 t uden udsigt til snarlig fødsel overvejes forløsning ved sectio
- Der er kontraindikation for scalp-elektrode, scalp-pH samt relativ kontraindikation for vacuum ekstraktion og tang.
- V/episiotomi gives profylaktisk antibiotika i.v. Zinacef 1,5 g. Infiltrationsanæstesi, pudendusblokada kan anvendes.
- Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum.
- Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur behandling af barn, samt HIV-screening.
- Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulans kontrol i infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet

### **FØDEPLAN v/ HIV-RNA 50-399 kopier/ml - Sectio**

- Der er planlagt at stile elektivt sectio GA 38-39.
- Hvis pt. indkommer akut i fødsel foretages akut sectio indfor 4-6 timer.
- Der skal ikke gives i.v. Zidovudin(Retrovir)
- Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum.
- Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur behandling af barn, samt HIV-screening.

### **FØDEPLAN v/ HIV-RNA 400-999 kopier/ml**

- Der er stiles mod elektivt sectio GA 38-39.
- Hvis pt. indkommer akut i fødsel foretages grad 3a sectio.
- Der skal ikke gives i.v. Zidovudin(Retrovir)
- Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum.
- Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur behandling af barn, samt HIV-screening.
- Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulat kontrol i infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet

### **FØDEPLAN v/ HIV-RNA > 1000 kopier/ml**

- Der er planlagt at stile mod elektivt sectio GA 38.
- Zidovudin(Retrovir) bestilles af obstetiker til 426/412 til planlagte operationsdag?
- Der opsættes i.v. Zidovudin (Retrovir) 2 mg/kg på afsnit 426/412 1 time før pt. går til operationsgangen – infusionen fortsætter indtil barnet er født.
- Hvis pt. indkommer akut i fødsel, opsættes straks i.v. Zidovudin(Retrovir) og foretages grad 2 sectio
- Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum.
- Barnet skal tilses akut af pædiater mhp. etablering af trestof behandling.
- Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulat kontrol i infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet

### **FØDEPLAN(akut)ved UKENDT HIV-STATUS.**

- Foretag en "kvik-HIV- test". Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt personsøger 2-2475. Svar kan foreligge i løbet af 15 min. Husk også at screene for Hepatitis B og C.
- Anskaf Zidovudin(Retrovir).
- Der opsættes i.v. Zidovudin (Retrovir) intrapartum (2 mg/kg over en time, derefter 1 mg/kg til endt fødsel) og gives en engangsdosis af Nevirapin 200 mg.
- Der foretages grad 2 sectio
- Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum.
- Barnet skal tilses akut af pædiater mhp. etablering af trestof behandling.
- Pt. tilses subakut af infektionsmediciner mhp. videre udredning og etablering af behandling.
- Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulat kontrol i infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet.