

Patientinformation

Information til patienter med ønske om graviditet og hvor vi har mistanke om at graviditeten sidder uden for livmoderen

Hvad fejler jeg?

Ultralydsundersøgelsen og målingerne af graviditetshormonet i blodet tyder på, at du har en graviditet uden for livmoderen. Oftest sidder graviditeten i æglederen. I specielle tilfælde, kan vi bevare æglederen, men de fleste patienter får den syge ægleder fjernet.


Kirurgisk behandling

Behandlingen har tidligere udelukkende bestået af operation. En sådan vil i de fleste tilfælde kunne foregå ved hjælp af en kikkert. I andre tilfælde må man gennem et bikinisnit fjerne æggelederen hvor graviditeten sidder. Alvorlige komplikationer ved bedøvelse og operation er meget sjældne. Den mest anvendte metode her på vores afdelingen er den kirurgiske behandling, hvor æggelederen fjernes. I helt specielle tilfælde, kan man nøjes med at fjerne graviditeten og bevare æggelederen.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandlingsmetode er også en mulighed til udvalgte tilfælde. Herved undgår du oftest operation (90%). Behandlingen består af én (eventuelt to) indsprøjtning(-er) af Methotrexate. Det har vist sig, at små doser af dette cellehæmmende stof får graviditeten i æglederen til at gå til grunde. Mulighederne for senere at opnå en normal graviditet på naturlig måde, er muligvis lidt bedre ved medicinsk behandling. På den anden side har du efter medicinsk behandling, større risiko for at en ekstra behandling bliver nødvendig (ca ¼ får fornyet behandling med Methotrexate). Behandlingen kan medføre forbigående bivirkninger 1 til 2 døgn efter indsprøjtningen i form af let kvalme eller madlede. Enkelte har bemærket blister i mundhulen. Tages medicinen kun en gang, er alvorlige bivirkningerne meget sjældne og har altid været forbigående.

Giver vi dig den medicinske behandling, er det naturligvis ekstra vigtigt, at vi har udelukket at graviditeten sidder inde i livmoderen, og måske bare vokser lidt langsomt. Derfor kan der gå længere tid fra den første dag du har været på hospitalet til vi kan starte den medicinske behandling (flere blodprøver, flere kontroller mv)



Du er med til at bestemme hvilken behandling der vil være bedst for dig.

Efterkontroller

Behandles du medicinsk, skal der tages nogle blodprøver på dig i efterforløbet. Dette skyldes, at medicinen ikke har fået bugt med alt graviditetsvævet. I den situation kan det være nødvendigt med yderligere behandling (kirurgisk eller medicinsk).

Både ved medicinsk behandling og operation skal du forvente at føle nogen smerte fra stedet, hvor graviditeten har siddet. Smerten kan almindeligvis mærkes i op til 1-4 uger efter, at behandlingen er afsluttet.

Hvornår må jeg blive gravid igen?

Efter behandlingen skal du vente (2)-3 måneder før du forsøger at blive gravid igen.

Med venlig hilsen

Lægerne på gynækologisk afdeling